

TRANSRECTAL ULTRASOUND BIOPSIES OF THE PROSTATE
Department of Urology, Kaiser Permanente San Francisco, French Campus

凱薩醫療中心三藩市法國分院泌尿科

直腸超聲波掃描之前列腺活組織抽樣檢查

我們已為您安排好時間做直腸超聲波前列腺檢查和前列腺針吸活組織抽樣檢查。在檢查前的一週之內，不可以服用任何阿斯匹林 **Aspirin, Motrin, Ibuprofen, Advil, Plavix, Naprosyn 或 Aleve**。如果您正在服用血液稀釋劑 (如四香豆定 Coumadin, 苳丙酮香豆素 Warfarin, 潘生丁 Persantine 等)，請知會您的醫生。在手術程序進行前，只可服用 Tylenol 或 Acetaminophen 止痛藥。

在準備手術程序前，請服用下列藥物：

1. 在檢查手術前 1 小時，口服 1 片 500 毫克的 Ciprofloxacin (這是一種抗生素，商標名稱是「CIPRO」)。服用第一片抗生素藥片 Ciprofloxacin 之後 6-12 小時，再服用第 2 片。
2. 在檢查手術前約兩小時，用「FLEET」牌子的灌腸劑清洗直腸。這種灌腸劑不需醫生處方，在藥房或超級市場均可買到。
3. 如果您遺失了抗生素藥片，請在預定檢查手術前 1 小時到來診所，我們會給您另 1 片藥片服用。
4. 進食適量的早餐和午餐；服食「CIPRO」藥丸只需要空腹兩小時即可。

手術程序後：別忘記約在 6 - 12 小時後再服用一片抗生素藥。

1. 手術程序後發生之併發症的機會少於百分之一。
2. 手術後，您會有以下情況出現：數日之內可能發現小便有血，或在數週之內發現精液有血。您也可能會有少量的直腸出血或有一兩天在大便後發現廁紙上有血跡。
3. 手術程序後很少會有發燒、震抖、發冷，或大小便大量出血的情形發生。如有任何這些情形出現，請立即致電泌尿科診所(415) 833-3107，以決定是否要立即接受治療。您亦可直接前往凱薩醫院急症室，地址是 2425 Geary Blvd.，在 Divisadero 街和 Masonic 街之間 (不是法國分院)。

謝謝！

泌尿科啓